Therapievorschläge

À la suite de bactérienne schéma approprié trouvé sont proposées. À quelle heure entrer dans des stades, est lue dans la section symptômes .

Stade I

Médicaments	Posologie /	Durée du traitement
La pénicilline g ou v	2 - 4 x 1,5 mega	2-3 Semaines
Céfuroxime	3 à 4 x 500 mg	2-3 Semaines
Amoxicilline	3 x 1000 mg (50 mg par kilogramme de poids corporel)	2-3 Semaines

Doxycycline devrait être utilisée pas au stade je parce que ce n'est que pendant le redoublement (toutes les heures 18-20) et le Borrelia puis-je entrer librement dans tout le tissu.

Stade II et III *.

Médicaments	Posologie /	Durée du traitement
Niveau 1 Azithromycine et Riamet ou MALARONE **ou** Télithromycine et Riamet ou MALARONE	 1 x 500 mg (3 Jours prenant / pause de 3 jours) 2 x 4. 4 x 1. 2 x 400 mg 2 x 4. 4 x 1.	6-12 Jours 7-14 Jours
alors...		
Niveau 2 MINOCYCLINE et Quensyl	 2 x 100 mg 2 x 200 mg	De 50 à 100 jours

ou Roxithromycine et Quensyl ou Clindamycine et Quensyl	 1 x 300 mg 2 x 200 mg 2 x 600 mg 2 x 200 mg	 50 Jours 20-25 Jours
alors...		
Niveau 3 Fluconazole *.	 200-400 mg (Enfants jusqu'à 40 kg de poids corporel : 100 mg)	 20-50 Jours

* avec corps manifeste institutions : Athritis, rhumatisme des tissus mous, Polynévrite, Radiculitis, encéphalomyélite, dépression, attaques de panique et mot erreurs de formation

Devrait le de fluconazole se produit pendant les plaintes conjointes qui s'aggrave, abrégé de la phase de fluconazole à 20 jours et a commencé à l'ensemble du régime du front.

Tous les stades de la maladie doivent être traitée antibiotique, donc aussi l'étape I, érythème migrans (randonnée blush). Seulement un traitement uniforme des migrans érythème peut éviter une Neuroborreliose. Bactéricides antibiotiques (pénicillines, macrolides, Cefalosporine) sont généralement plus efficaces que la doxycycline. Parce qu'effet seulement bactériostatique doxycycline (c.-à-d. inhibe la croissance et la reproduction de la Borrelisoe), il devrait pas comme un antibiotique de la 1. élection considérée comme à l'être, mais être vu au moins 3-4 semaines. Pour cette raison doit s'attendre avec une apparition plus lente par rapport à la pénicilline ou céphalosporines. Le seul avantage de Doxycyxlin est qu'elle agit contre Ehrlichien, tone bar point et Babesia peut aussi être transmis par une morsure de tique.

Devrait être explicitement fait remarquer que le fluconazole en raison de ses bons niveaux active dans le système nerveux central seulement lorsque les symptômes neurologiques utilisé pour être. Un Neuroborreliose est diagnostiquée par les critères suivants :

- Positive blot ELISA ou Western avec un gang de diagnostics **et**
- changer les symptômes typiques, tels que la douleur de nerf obscure et errant (surtout la nuit), paralysie des extrémités, dépression, Vergeßlichkeiten et les attaques de panique

Important : Exclusion des autres maladies par les Diagnostics de laboratoire (sang) et des études de résonance magnétique nucléaire.
Fluconazole évidemment pas tue le Borrelia dans le système nerveux central, mais uniquement sur la croissance et de reproduction éviter ce traitement doit être effectuée au moins environ de 20 à 50 jours, pour atteindre un succès durable. Devraient il y encore plaintes, le schéma thérapeutique (antibiotiques, puis fluconazole) peut être répétés jusqu'à trois fois un après l'autre.



Schéma - cliquez ici pour agrandir juste dans l'image

La compatibilité du fluconazole est très bonne. Cela signifie tend toutefois due à la pharmacocinétique à une série d'interactions avec d'autres médicaments. **Donc fluconazole devrait également toujours virages à un traitement antibiotique et en même temps, jamais à utiliser. En outre, le traitement par fluconazole devrait être terminé être.**